

Vergelijkend onderzoek van patiëntvariabelen van een forensische polikliniek en ambulante verslavingspsychiatrie

Schuthof, G.; Oei, T.I.

Published in:
[n.n.]

Publication date:
2008

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

Schuthof, G., & Oei, T. I. (2008). Vergelijkend onderzoek van patiëntvariabelen van een forensische polikliniek en ambulante verslavingspsychiatrie. In *[n.n.]* (Vol. 50, pp. S142-S143). (Tijdschrift voor Psychiatrie; Vol. 50). Unknown Publisher.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright, please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Vergelijkend onderzoek van patiëntvariabelen van een forensische polikliniek en ambulante verslavingspsychiatrie

G. SCHUTHOF, T.I. OEI
schut657@wxs.nl

ACHTERGROND Na bestudering van de patiëntkarakteristieken van een forensische polikliniek bleek 50% een probleem te kennen met middelengebruik. De vraag diende zich aan of er iets te zeggen zou zijn over overeenkomsten en verschillen tussen mensen die primair naar een forensische polikliniek werden verwezen en patiënten die naar een verslavingsinstelling werden verwezen.

METHODE Van 100 respectievelijk 80 patiënten uit de beide categorieën werden de dossiers vergeleken op leeftijd geslacht, culturele oorsprong en stoornissen volgens DSM-IV.

RESULTATEN Er waren maar weinig verschillen in patiëntvariabelen betreffende het voorkomen van stemmingsklachten, angststoornissen en het voorkomen van cluster B- en C-persoonlijkheidsstoornissen.

CONCLUSIES Hoewel er een andere verwijzingsgrond is voor forensische patiënten en patiënten met een verslavingsprobleem, zijn er overwegend veel overeenkomsten in de incidentie van psychiatrische stoornissen en cluster B- en C-persoonlijkheidsstoornissen in beide onderzochte groepen.

AANBEVELINGEN Is er een grond om te onderzoeken of onderliggende symptomen in plaats van syndromen meer inzet moeten zijn van diagnostiek en behandeling? Zou een integratie van grote delen van de verslavingszorg en forensische psychiatrie niet van groot voordeel kunnen zijn? Onderzoek naar de behandelresultaten op symptoomniveau lijken een onderzoek meer dan waard.